



Gulrost



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden


Rastester 2015

Kranich
Warrior
Warrior (-)
Triticale agressive
Pst S3
Triticale 15
Hereford



■ Kranich ■ Warrior ■ Warrior (-)
■ Triticale agressive ■ Pst S3 ■ Triticale 15
■ Hereford

Frequency of races sampled from Sweden



(c) Copyright Global Rust Reference Center, 2016









Betydelse av gulrost på hösten?

Skånsk försöksserie 2012-2014 (påbörjades hösten 2011).
Inga av de provade preparaten registrerade för höstbehandling.

2012:

Höstbehandlade led hade bättre beståndsutveckling på våren och gav merskördar på ca 0,5 ton/ha. Orsaken till merskördarna för höstbehandling var av fysiologisk karaktär och berodde inte på effekt mot gulrost.

2013-2014:

Beståndsutveckling vår – inga skillnader.

Höstbehandling inget extra mervärde.

Behandling under försommar viktig vid kraftiga angrepp.

Resistenstester rapsbaggar




Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden



Rapsbaggars känslighet för Biscaya

2009 - 2015 vid 100% fältdos

Teströr från Bayer



Rapsbaggars känslighet för Biscaya och Mospilan 2015 vid 100 % fältdos

Teströr från BTL

